

學生流感疫苗接種後注意事項

- ◆ 發燒反應觀察與處置：接種後 48 小時內約有 1-2% 可能出現發燒反應，就醫時應主動告知醫師接種史；若發燒超過 48 小時，應警覺是否有其他感染因素。
- ◆ 異常症狀緊急就醫：如出現持續發燒、意識或行為改變、呼吸困難、心跳加速等嚴重不適，應立即就醫，並同步通報學校師長。
- ◆ 維持個人防疫衛生：接種疫苗可降低流感感染率，但無法預防其他病毒引起之感冒。建議仍需落實勤洗手、注意個人衛生，以維護身體健康。
- ◆ 聚集性暈針現象：暈針多發生於青少年集體接種，主因對打針的心理壓力或恐懼轉化為眩暈、噁心等生理症狀，與疫苗安全性無關，亦無後遺症。此類「集體心因性疾病」偶發於大規模接種，若學生返家後症狀持續，請務必儘速送醫診治。
- ◆ 特定病史加壓止血：若有凝血功能異常或服用抗凝血藥物者，於注射後應在部位加壓至少 2 分鐘，並密切觀察是否有持續性出血或血腫情形。
- ◆ 接種劑次補充說明：貴子女如為出生後首次接種流感疫苗之國小二年級以下學童，可於第一劑接種至少四週後，至醫療院所自費接種第二劑。